



Thrombosis Canada
Thrombose Canada

Le dépistage de la thrombophilie pour vous et votre famille


Qu'est-ce que la thrombophilie?

La thrombophilie est une affection qui augmente la capacité normale de coagulation du sang.

- Présence excessive de ce qui favorise la coagulation du sang.
- Présence insuffisante de ce qui empêche la coagulation du sang.

Comment se fait le dépistage de la thrombophilie?

- Le dépistage de la thrombophilie (une affection généralement héréditaire, c'est-à-dire transmise des parents aux enfants) se base sur des analyses sanguines.
- Voici quelques exemples d'analyses courantes :




Qui devrait être soumis aux tests de dépistage?

Pour la plupart des gens, il n'est pas nécessaire de passer un test de dépistage.

Il est plus difficile d'obtenir une assurance vie si les analyses révèlent quelque chose.

Les résultats d'analyses qui sont simplement réalisées à un mauvais moment peuvent causer beaucoup de confusion.

Les analyses coûtent cher au système de santé.



Que faire si je suis atteint(e) de thrombophilie?

La thrombophilie peut augmenter votre risque d'un premier caillot sanguin (même si le risque est encore faible).

Si vous n'avez jamais eu de caillot sanguin, il n'est pas nécessaire de recevoir un traitement.

Si vous avez un caillot sanguin, c'est généralement dû à d'autres facteurs plus importants que la thrombophilie.

C'est pourquoi le traitement d'un caillot sanguin ne sera pas différent si les analyses révèlent que vous êtes atteint(e) de thrombophilie ou pas.

Si vous êtes enceinte ou si vous prenez des œstrogènes, demandez à votre médecin si cela peut avoir de l'importance.

Qu'en est-il de ma famille?

Il n'est pas nécessaire de soumettre tous les membres de votre famille aux tests de dépistage.

Le fait qu'un de vos parents proches ait un caillot sanguin augmente votre risque d'en avoir un aussi, même si les résultats des analyses de votre famille sont négatifs, car les analyses ne détectent pas tout.

Les membres de votre famille doivent connaître les symptômes d'un caillot sanguin et les facteurs qui augmentent leur risque d'en avoir un.

Ainsi, si cela devait se produire, ils pourraient en parler à leur médecin.

Message à retenir

- Il existe de nombreux facteurs qui peuvent augmenter le risque de caillots sanguins.
- Les tests génétiques ne changeront rien à la façon dont vous serez traité(e) pour des caillots sanguins.
- Les tests de dépistage de la thrombophilie ne sont pas nécessaires pour la plupart des gens et les membres de leur famille.



Suivez-nous sur Twitter : @ThrombosisCan



Téléchargez notre application dans les boutiques iTunes, Google Play et Windows

Thrombosis Canada/Thrombose Canada

1043 King Street West, Suite 201, Hamilton, ON, L8S 1L6

Courriel : info@thrombosiscanada.ca • Tél : 905.525.8213 • Téléc : 866.714.5521

www.thrombosiscanada.ca