

QU'EST-CE QUE L'ÉDOXABAN ?

- ✓ L'édoxaban est un anticoagulant (qui éclaircit le sang). Les anticoagulants aident à traiter et à prévenir les caillots sanguins.

VOUS PRENEZ L'ÉDOXABAN POUR AIDER À :

- ✓ Prévenir les AVC en raison de votre fibrillation auriculaire.
- ✓ Traiter le caillot sanguin dans votre jambe (thrombose veineuse profonde [TVP]) ou dans votre poumon (embolie pulmonaire [EP]).

VOTRE DOSE D'ÉDOXABAN EST LA SUIVANTE :

- ✓ Fibrillation auriculaire : édoxaban 60 mg une fois par jour (ou 30 mg une fois par jour pour certaines personnes).
- ✓ Traitement de la TVP ou de l'EP : édoxaban 60 mg une fois par jour (30 mg une fois par jour pour certaines personnes) après avoir reçu un anticoagulant par injection pendant 5 à 10 jours. Vous recevrez la même dose d'édoxaban pendant toute la durée du traitement.



CONSEILS PRATIQUES POUR LA PRISE DE L'ÉDOXABAN :

L'édoxaban doit être pris une fois par jour à la même heure chaque jour, avec ou sans nourriture.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE SI VOUS OUBLIEZ UNE DOSE ?

Il est important de prendre l'édoxaban régulièrement. Si vous oubliez une dose :

- prenez cette dose dès que vous constatez votre oubli si c'est le jour même, puis prenez la dose suivante le lendemain à l'heure habituelle ;
- ne prenez jamais plus d'une dose au même moment pour compenser une dose oubliée.

L'ÉDOXABAN A-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES ?

La plupart des personnes n'ont jamais d'effets secondaires.

- Les anticoagulants peuvent accroître le risque de saignement, mais la plupart des saignements, le cas échéant, sont mineurs.
 - Les saignements mineurs cessent d'eux-mêmes et sont de courte durée. Exemples de saignements mineurs : saignement de nez, saignement des gencives, ecchymose, etc.
- Les hémorragies majeures (voir ci-dessous) sont plus graves. Elles nécessitent des soins médicaux et l'arrêt de l'édoxaban, du moins temporairement.



ÉDOXABAN AUSSI CONNU SOUS LE NOM COMMERCIAL : LIXIANA®

À QUEL MOMENT DEVRIEZ-VOUS COMMUNIQUER D'URGENCE AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ ?

Dès l'apparition de l'un ou l'autre des symptômes de saignement suivants :

- Pâleur, grande faiblesse et fatigue, souffle court ou douleur à la poitrine
- Selles noires, goudronneuses ou sanglantes
- Saignement du rectum
- Urine rose/rouge ou foncée
- Menstruations excessives
- Toux avec émission de sang ou vomissements de sang
- Tout saignement qui n'arrête pas
- Blessure corporelle, comme une blessure à la tête, une fracture osseuse ou une blessure sportive, ou un accident de voiture

QUE DEVRIEZ-VOUS DIRE À VOS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ?

- Assurez-vous de dire à vos professionnels de la santé que vous prenez l'édoxaban, si vous devez subir une intervention chirurgicale ou dentaire, un traitement chiropratique ou une procédure effractive, ou si vous êtes exposé à un risque de saignement ;
- vous commencez à prendre un nouveau médicament d'ordonnance ou en vente libre ;
- vous pratiquez des sports de contact ou toute activité présentant un risque de blessure ou de saignement ; ces activités ne sont pas recommandées et il est nécessaire que vous en parliez à votre professionnel de la santé.

LA PRISE DE L'ÉDOXABAN DOIT-ELLE FAIRE L'OBJET D'UNE SURVEILLANCE ?

- Les analyses de sang pour vérifier la concentration d'édoxaban ne sont pas nécessaires. Votre professionnel de la santé vérifiera votre fonction rénale (par une analyse de sang) une fois par année, ou plus fréquemment si vos reins ne fonctionnent pas adéquatement.
- Vous devriez avoir une carte-portefeuille ou porter un bracelet médical indiquant que vous pre-nez un anticoagulant.



MESSAGES À RETENIR

- L'édoxaban réduit le risque de formation de caillots sanguins.
- Souvenez-vous de prendre l'édoxaban au moment prescrit et de renouveler d'avance votre or-donnance.
- Si vous oubliez ou sautez des doses, cela va amoindrir l'efficacité du médicament.
- Prenez l'édoxaban pendant toute la période prescrite par votre médecin et n'arrêtez pas de le prendre sans consulter d'abord votre médecin.
- Signalez immédiatement tout saignement inhabituel ou grave.
- Tout changement dans votre état de santé et/ou vos médicaments peut avoir des répercussions sur l'édoxaban. En présence de tels changements, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.
- C'est une bonne idée que de porter un bracelet médical ou d'avoir une carte-portefeuille.



Thrombosis Canada
Thrombose Canada

128 HALLS RD, WHITBY, ON, L1P 1Y8
TÉL | 647-528-8586
COURRIEL | info@thrombosiscanada.ca
WEB | www.ThrombosisCanada.ca

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION
DANS LES
BOUTIQUES
 Google play
 iTunes
 Microsoft Store

SUIVEZ-NOUS SUR
TWITTER 
@THROMBOSISCAN